

5 FLUORO URACILE

5 FLUORO URACILE® EN VOIE CUTANEE : EFUDIX®

Laboratoires

Génériques

Description médicament

Chimiothérapie

Classe des antimétabolites, analogue des bases pyrimidiques

Conditions de prescription et de délivrance

Prescription et délivrance hospitalière

Possibilité de perfusion continue au domicile

Métabolisme

- Métabolisme hépatique
- Demi-vie = 15'
- Elimination fécale prédominante

Alertes

- Contre indications : Grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement
- **Risque de spasmes coronariens. En cas de douleurs thoraciques, arrêt de la perfusion en cours.**

Indications

- Cancer colorectal
- Cancer du sein
- Cancer épidermoïde des voies aéro digestives supérieures et de l'œsophage
- Adénocarcinome de l'ovaire

Voie et mode d'administration

Voie intra-veineuse :

Activité modulable par l'acide folinique

IVD, perfusion d'une heure environ, ou perfusion continue sur 48 heures à 10 jours

- en monothérapie

- en association

Voie intra artérielle (hépatique) :

Perfusion lente de 4 à 6 heures

Voies locales :

Intra-vésicale, intra cavitaire, intra péritonéale, cutanée

Voie intramusculaire interdite

Mises en garde - effets indésirables

- Diarrhées, ulcérations gastro-intestinales
- Stomatites → hygiène buccale +++
- Desquamation palmo plantaire (syndrome mains-pieds)
- Leucopénie, thrombopénie, anémie
- Nausées, vomissements fréquents, immédiats
- Veinite, thrombophlébite
- Alopecie rare
- Conjonctivite, hypersécrétion lacrymale
- Pigmentation cutanée, photosensibilisation
- Angor, infarctus : rares
- Ataxie cérébelleuse, encéphalite : rares

Interactions

- Phénytoïne contre-indiquée
- Précautions avec les anticoagulants
- Association à prendre en compte avec :
 - acide folinique (en dehors du protocole thérapeutique)
 - interféron alpha
 - métronidazole, ornidazole