

BIPHOSPHONATES : PAMIDRONATE**AREDIA®****Laboratoires**

Mylan
Tel pharmacovigilance : 08 10 12 35 50
Génériques

Description médicament

Inhibition de la résorption osseuse.

Conditions de prescription et de délivrance

Prescription, délivrance et usage hospitaliers

Métabolisme

- Clairance diminuée en cas d'insuffisance rénale

Alertes

- Contre indications : Grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement

Attention ostéo-nécrose de la mâchoire, cf. effets secondaires.

Indications

Traitement de l'hypercalcémie maligne.
Prévention des complications et des douleurs liées à la présence de métastases osseuses.

Voie et mode d'administration

Ces médicaments doivent être donnés chez des patients bien hydratés, avec surveillance de la fonction rénale et de la calcémie.

Dans le cas de traitements au long cours pour les métastases osseuses, il est recommandé d'associer du calcium et de la vitamine D.

Perfusion IV : dose adaptée à la clairance de la créatinine.

Respecter les dilutions et les délais de perfusion. Perfusion lente (2h).

Mises en garde - effets indésirablesClassiques :

Fièvre voire syndrome grippal dans les 24h suivant l'injection IV.

Hypocalcémie symptomatique dans 20% des cas

Nausées, vomissements, diarrhée

Douleurs osseuses et musculaires rares.

Insuffisance rénale favorisée par la déshydratation et l'association à d'autres néphrotoxiques.

Risque d'hypomagnésémie et hypophosphatémie.

Graves: Alertes

Ostéonécrose de la mâchoire possible dans les traitements de longue durée

Prévention par mise en état buccodentaire avant le traitement, hygiène buccale et dentaire, précautions à l'occasion de soins dentaires s'ils sont indispensables.

Interactions

- Précautions avec les aminosides et autres néphrotoxiques