

Laboratoires

Janssen Cilag
Tél pharmacovigilance : 08 00 25 50 75

Description médicament

Chimiothérapie
Inhibiteur de protéasome

Conditions de prescription et de délivrance

Prescription, délivrance et usage hospitalier
(mais sur la liste de rétrocession)

Métabolisme

- Demi-vie 9 à 15h.
- Voie métabolique non identifiée.

Alertes

- Contre indications : Grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement

Indications

Myélome multiple

Voie et mode d'administration

IV
Solvant ; mannitol, bore
Schéma : standard : deux fois par semaine deux semaines de suite. Un cycle toutes les 3 semaines

Mises en garde - effets indésirables

- **Thrombocytopénie**, nadir à J 11
- **Neuropathies périphériques sensorielles**
- Troubles digestifs à type nausées, vomissements, troubles du transit
- Hypo ou hyper glycémie
- Hypotension orthostatique, troubles du rythme, allongement du QT
- Troubles de l'état général (asthénie, fièvre céphalées, malaise, myalgies, arthralgies) principalement aux deux premières cures.
- Dyspnée, toux
- Eruption cutanée
- Vertiges, insomnies, confusion, convulsions

Interactions