

Laboratoires

MERCK LIPHA SANTE

Tel Pharmacovigilance : 0800 88 80 24

Description médicament

Thérapie ciblée.

Anticorps monoclonal anti EGF-R.

Conditions de prescription et de délivrance

Prescription, délivrance et usage hospitaliers.

Métabolisme

Demi vie d'élimination longue (70 à 100 h)

Alertes

- Contre indications : Grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement

Indications

- Cancer colo-rectal (avec gène K-Ras sauvage).
- Cancer épidermoïde de la tête et cou.

Voie et mode d'administration

Perfusion IV : 120 min la première fois, 60 min les suivantes.

Dose de charge à la première injection, puis dose diminuée, identique pour toutes les injections suivantes.

Mises en garde - effets indésirables

Fréquentes :

- Réactions cutanées : éruption acnéiforme, prurit, sécheresse cutanée, hypertrichose, onycholyse, photosensibilisation
- Adaptation de la dose à l'intensité de la réaction cutanée.
- Diarrhée, hypomagnésémie.
- Dyspnée
- Asthénie

Rares :

- Pneumopathie interstitielle