

CHLORAMBUCIL CHLORAMINOPHENE®

Laboratoires

Techni Pharma
Tél pharmacovigilance : (00 377) 92 05 75 10

Description médicament

Chimiothérapie
Agent alkylant

Conditions de prescription et de délivrance

Forme orale : ne pas ouvrir les gélules
Prescription hospitalière, disponible en ville
Gélules dosées à 2 mg
Conservation à une température n'excédant pas 25°

Métabolisme

- Métabolites éliminés par voie rénale
- Métabolisation hépatique

Alertes

- Contre indications : Grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement
- Adaptation de la posologie en cas d'insuffisance rénale

Indications

- Leucémie Lymphoïde Chronique
- Lymphome non hodgkinien et maladie de Hodgkin

Voie et mode d'administration

Per os en une seule fois le matin à jeun
Cure continue ou discontinue

Mises en garde - effets indésirables

- Leucopénie, thrombopénie dose dépendantes, cumulatives, réversibles
- Hyperuricémie
- Nausées, vomissements, modérés fréquents
- Toxicité pulmonaire rare, grave si dose totale > 2500 mg
- Toxicité gonadique rare : oligospermie, azoospermie, aménorrhée, ménopause précoce
- Médicament leucémogène

Interactions

- Phénytoïne contre-indiquée
- Précautions avec les anticoagulants