

Laboratoires

Génopharm

Tél pharmacovigilance : 01 64 12 21 12

Description médicament

Chimiothérapie, moutarde azotée.

Conditions de prescription et de délivrance

Prescription, délivrance et usage hospitaliers pour la forme IV

Application cutanée possible (préparation magistrale en PUI, rétrocédable)

Métabolisme

Élimination urinaire.

Alertes

- Contre indications : grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement

Indications

Maladie de Hodgkin

Lymphome cutané T épidermotrope (mycosis fongoïde)

Voie et mode d'administration

Administration IV

Application cutanée

Mises en garde - effets indésirables

Administration IV :

- Toxicité hématologique
- Nausées, vomissements, diarrhées

- Hypersensibilité
- Irritation au point de perfusion, veinite
- Pas de prescription concomitante à une radiothérapie
- Risque de survenue à distance d'un second cancer.

Administration cutanée :

- Erythème, prurit, vésicule
- Xérose
- Télangiectasies
- Hyperpigmentation

Interactions

- Phénytoïne contre-indiquée
- Précautions avec les anticoagulants.