

Laboratoires

Sanofi Aventis
Tél pharmacovigilance : 08 00 39 40 00

Description médicament

Chimiothérapie
Agent alkylant

Conditions de prescription et de délivrance

Prescription, délivrance et usage hospitalier
(possibilité de rétrocession)

Métabolisme

- Métabolisme hépatique.
- Elimination majoritairement urinaire.

Alertes

- Contre indications : Grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement

Indications

- Mélanome.
- Lymphome non hodgkinien et la maladie de Hodgkin.
- Sarcome des tissus mous.

Voie et mode d'administration

Perfusion intra veineuse en 30 minutes au minimum, **à l'abri de la lumière**, en monothérapie ou en association.

Adaptation posologie en cas d'insuffisance rénale.

Mises en garde - effets indésirables

Fréquents :

- Syndrome pseudo grippal, apparaissant en 7 jours, durant de 1 à 3 semaines, à traiter par antipyrétiques
- Nausées, vomissements, immédiats mais aussi parfois retardés
- Toxicité hématologique
- Alopecie modérée
- Photosensibilisation

Rares :

- Hypersensibilité
- En association à la fotémustine, risque de toxicité pulmonaire

Interactions

- Phénytoïne contre-indiquée
- Médicaments à toxicité rénale
- Précautions avec les anticoagulants