

Laboratoires

Sanofi Aventis
Tel pharmacovigilance : 08 00 39 40 00

Description médicament

Chimiothérapie : action sur la mitose

Conditions de prescription et de délivrance

Prescription, délivrance et usage hospitalier

Métabolisme

- Métabolisme hépatique (cyto P450)
- Elimination essentiellement biliaire.

Alertes

- Contre indications : Grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement
- **Solvant allergisant (polysorbate 80) : prévention par corticoïdes**

Indications

- cancer bronchique non à petites cellules, du sein, de la prostate métastatique, de l'estomac, ORL

Voie et mode d'administration

Perfusion intraveineuse, en monothérapie ou en association

Mises en garde - effets indésirables

Fréquents :

- Toxicité hématologique : Neutropénie
- Mucite et toxicité digestive (nausées, vomissements, diarrhée)
- Alopécie, asthénie
- Réaction d'hypersensibilité
- Neuropathie
- Arthralgies, myalgies
- Altération des ongles
- Œdèmes et épanchements (dose dépendant cumulatif, parfois retardés) : surveillance cardiaque
- Dyspnée

Rares :

- Réactions cutanées palmo-plantaires
- Larmoiements, obstruction canal lacrymal possibles

Interactions

- Interaction avec imidazolés, erythromycine, clarithromycine et certains antirétroviraux
- Phénytoïne contre-indiquée
- Précautions avec les anticoagulants