

# DOXORUBICINE LIPOSOMALE PEGYLEE

**CAELYX®**

## Laboratoires

Janssen Cilag

Tel pharmacovigilance : 01 55 00 45 00

## Description médicament

Chimiothérapie, anthracycline, action sur l'ADN

## Conditions de prescription et de délivrance

Prescription, délivrance et usage hospitalier  
(possibilité de rétrocession)

## Métabolisme

- Elimination essentiellement biliaire.
- Colore les urines en rouge.

## Alertes

- Contre indications : Grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement

## Indications

- Cancer de l'ovaire, du sein
- Sarcome de Kaposi

## Voie et mode d'administration

Perfusion intra veineuse, plus lente pour la première injection

Cycle de 2 à 4 semaines

Ne pas dépasser la dose cumulée de 450 mg/m<sup>2</sup>

## Mises en garde - effets indésirables

### Fréquents :

- Toxicité hématologique
- Sur les 3 lignées

- Toxicité digestive (vomissement, diarrhée) et mucite
- Alopécie
- Toxicité cardiaque, immédiate ou retardée et cumulative

(Bilan et surveillance nécessaire)

- Syndrome mains-pieds

### Rares :

- Hépatique : rare, réversible
- Pulmonaire surtout en cas de radiothérapie
- Hypersensibilité

## Interactions

- Phénytoïne contre-indiquée
- Précautions avec les anticoagulants