

ETOPOSIDE ou VP16**VEPESIDE® - ETOPOPHOS® - CELLTOP®****Laboratoires**

Genopharm : 01 64 12 21 12

Baxter : 01 34 61 50 50

Bristol-Myers Squibb : 08 10 41 05 00

Description médicament

Chimiothérapie. Inhibiteur de topoisomérase, action sur la mitose.

Conditions de prescription et de délivrance

Voie veineuse : Prescription, délivrance et usage hospitalier.

Voie orale : prescription hospitalière, disponible en ville.

Métabolisme

- Demi-vie autour de 6h, élimination urinaire.
- Forte liaison aux protéines plasmatiques.

Alertes

- Contre indications : grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement

Indications

Oncologie : cancers du testicule, cancers du poumon, cancers du sein, chorio-carcinome placentaire.

Hématologie : LNH, maladie de Hodgkin, protocoles d'intensification, leucémies aigües.

Voie et mode d'administration

Voie veineuse en perfusion lente.

Voie orale : les capsules se conservent à température ambiante et à l'abri de la lumière, fractionner la dose en deux à trois prises par jour.

Les capsules ne doivent être ni broyées ni ouvertes ni mâchées.

Adaptation de la dose en cas d'insuffisance rénale.

Mises en garde - effets indésirables

Fréquents :

- Toxicité surtout hématologique : leucopénie, thrombopénie
- Nausées, vomissements, mucites
- Réaction d'hypersensibilité : hyperthermie, bronchospasme, dyspnée, uniquement pour administration IV

Plus rares :

- Neuropathie périphérique, encéphalopathie, myasthénie.
- Hypotension et parfois hypertension.

Interactions

- Phénytoïne
- Précautions avec les anticoagulants
- Contre indiqué si intolérance au fructose