

Laboratoires

BMS

Tél pharmacovigilance : 08 10 41 05 00

Description médicament

Chimiothérapie, antimétabolite

Conditions de prescription et de délivrance

Prescription initiale hospitalière

Délivrance en ville pour la forme per os

Métabolisme

Pic d'absorption : 1 à 2h

Passe la barrière hémato encéphalique

Élimination urinaire, adaptation de dose si insuffisance rénale

Demi vie : 6 h

Alertes

Contre indications :

- Grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement
- Contient du lactose dans les excipients

Indications

- Leucémie myéloïde chronique
- Splénomégalie myéloïde
- Polyglobulie
- Thrombocytémie essentielle

Voie et mode d'administration

Per os, en 2 ou 3 prises

Possibilité d'ouvrir les gélules

Mises en garde - effets indésirables

- Leuconeutropénie
- Nausées vomissements, diarrhée
- Aphtes
- Sécheresse cutanée, prurit
- Intolérance au lactose.

Interactions

- Phénytoïne, vaccins vivants atténués, autres immunosuppresseurs
- Radiothérapie externe