

Laboratoires

Novartis

Tel Pharmacovigilance : 01 55 47 66 00

Description médicament

Thérapeutique ciblée.

Inhibiteur de tyrosine-kinase

Conditions de prescription et de délivrance

Prescription initiale hospitalière (6 mois)

Disponible en ville

Métabolisme

- Pas de métabolisme rénal.
- Adaptation de posologie en cas d'insuffisance hépatique.
- Demi-vie d'élimination 16-18 h

Alertes

- Contre indications : grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement

Indications

Tumeur stromale gastro-intestinale (GIST)

Hématologie :

- leucémie avec chromosome Phi +
- syndromes myélodysplasiques / myéloprolifératifs
- maladie de Darier-Ferrand

Voie et mode d'administration

Traitement par voie orale, à prendre au cours d'un repas avec un grand verre d'eau, en position assise.

Si le patient ne peut avaler le comprimé, il est possible de le disperser dans de l'eau ou du jus de pomme.

Une prise par jour en dessous de 800 mg, deux prises par jour à partir de la dose de 800 mg.

Mises en garde - effets indésirables

Fréquents :

- Hématologiques : neutropénie, thrombopénie, anémie
- Neurologiques : céphalées, syndrome confusionnel
- Gastro-intestinaux : nausées, vomissements, diarrhée, douleur abdominale
- Dermatologiques : œdème périorbitaire, eczéma, rash
- Généraux : Rétention hydro sodée, fatigue, œdème, douleurs musculaires et/ou articulaires, risque d'hypo ou d'hyperkaliémie et hyponatrémie

Rares :

- Hypertension, voire insuffisance cardiaque.
- Pneumopathie interstitielle.

Interactions

- Médicaments interagissant avec le cytochrome P450.
- Interaction possible avec le paracétamol.