

Laboratoires

Pfizer

Tél pharmacovigilance : 01 58 07 34 40

Description médicament

Type de produits

Chimiothérapie. Action toxique sur l'ADN

Conditions de prescription et de délivrance

Prescription, délivrance et usage hospitalier

Métabolisme

- Demi-vie d'élimination est de 15 à 20 heures.
- Elimination urinaire.

Alertes

- Contre indications : Grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement
- ATCD de maladies inflammatoires de l'intestin

Indications

- Cancer colorectal

Voie et mode d'administration

En monothérapie ou en association

Adaptation posologique en cas d'insuffisance hépatique (Biliburine)

Mises en garde - effets indésirables

Toxicité digestive :

- **Diarrhée précoce :**

- Indépendante de la dose
- Liée à un syndrome cholinergique transitoire prévenu par l'atropine SC
- Accompagnée de crampes, hypersalivation, hypersudation, larmolement et troubles de l'accommodation

- Diarrhée retardée, parfois sévère :

- Le traitement doit débuter au plus vite : prescription précoce de l'opéramide à forte dose si nécessaire.

Consultation impérative si la diarrhée n'est pas maîtrisée en 48 heures !

- Nausées, vomissements très fréquents

Autres :

- Toxicité hématologique : neutropénie
- Alopécie très fréquente
- Asthénie

Interactions

- Phénytoïne contre-indiquée
- Millepertuis contre-indiqué
- Précautions avec les anticoagulants