

Laboratoires

GSK
Tél pharmacovigilance : 01 39 17 80 16

Description médicament

Chimiothérapie. Agent alkylant

Conditions de prescription et de délivrance

Prescription hospitalière disponible en ville pour la voie orale

Métabolisme

- Absorption digestive très variable, élimination urinaire
- Demi vie : de 0,5 à 2 heures

Alertes

- Contre indications : Grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement

Indications

Per os :

- Myélome multiple
- Cancer de l'ovaire
- Cancer du sein

Voie parentérale :

Intensification thérapeutique

Voie et mode d'administration

Per os : A conserver entre + 2 et + 8 °C

Ne pas pulvériser ni écraser les comprimés

Ne pas administrer les comprimés au cours du repas

Fractionné en plusieurs prises, 15 à 30 min avant un repas.

Voie IV : utilisée en association

Adaptation de dose si insuffisance rénale

Mises en garde - effets indésirables

- Toxicité hématologique
- Toxicité digestive très modérée
- Médicament leucémogène

Interactions

- Précautions avec les anticoagulants