

MESNA**UROMITEXAN®****Laboratoires**

Baxter

Tél pharmacovigilance : 01 34 61 50 50

Description médicament

Cytoprotecteur des voies urinaires.

Existe par voie intraveineuse ou orale (doubler la dose)

Conditions de prescription et de délivrance

Prescription et délivrance hospitalières

MétabolismeAbsorption digestive rapide par voie orale
Métabolisme rénal

Demi-vie d'une heure environ

Éliminé sous forme active dans les urines

Alertes

- Contre indications : grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement

Précaution en cas de maladie auto-immune, augmente le risque de rash cutané.

Indications

Utilisé en association avec l'Holoxan® (Ifosfamide) et dans certains cas avec l'Endoxan® (Cyclophosphamide) pour éviter la toxicité vésicale

Voie et mode d'administration

Perfusion IV pendant et jusqu'à 8 h après la chimiothérapie

- soit 1/3 de dose pendant, 1/3 de dose 4 h après, 1/3 de dose 8 h après
- soit en perfusion continue

Mises en garde - effets indésirables**Nausées, vomissements** (attention si forme orale, faire relais IV)

Rash cutané en cas de maladie auto-immune

Encéphalopathie, réversible, majorée en cas d'insuffisance rénale ou d'hypoalbuminémie. Apparition 20 à 50h après la perfusion

Arthralgies

Interactions

Ne pas administrer en même temps qu'un produit de chimiothérapie autre que l'ifosfamide ou le cyclophosphamide (rincer impérativement), ni en même temps que érythromycine, lipiodol, aminophylline, oxytétracycline (incompatibilité physico-chimique)