

PACLITAXEL**TAXOL® PAXENE®****Laboratoires**

Bristol Meyer Squibb
Tél pharmacovigilance : 08 10 41 05 00
Norton Healthcare
Génériques

Description médicament**Type de produits**

Chimiothérapie : action sur la mitose

Conditions de prescription et de délivrance

Prescription, délivrance et usage hospitalier

Métabolisme

- Forte liaison aux protéines.
- Métabolisme hépatique par les cytochromes P 450.
- Demi-vie de 19 heures.
- Elimination biliaire.

Alertes

- Contre indications : Grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement

Indications

- Cancer de l'ovaire, du sein et du poumon
- Syndrome de Kaposi

Voie et mode d'administration

Voie veineuse en monothérapie ou en association.

Prémédication indispensable avec les corticoïdes, des antihistaminiques et des antagonistes des récepteurs H2

Mises en garde - effets indésirables

Fréquents :

- **Toxicité hématologique :**

- Sur les 3 lignées

- Toxicité neurologique :

- **Neuropathie périphérique** surtout associé aux sels de platine, cumulative.

- Autres :

- Myalgies et arthralgies
- Alopécie constante
- Modifications des ongles

Moins Fréquents :

- Troubles digestifs

Plus rares :

- Troubles de la conduction (bradycardie).

Interactions

- Interactions avec le cytochrome P 450
- Précautions avec les anticoagulants