

PEMETREXED**ALIMTA®****Laboratoires**

Lilly

Tel pharmaco vigilance : 08 00 00 36 36

Description médicament

Chimiothérapie : Anti-métabolite

Conditions de prescription et de délivrance

Prescription, délivrance et usage hospitalier

Métabolisme

- Fortement lié aux protéines.
- Elimination rénale.

Alertes

- Contre indications : Grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement

Indications

Cancer du poumon et mésothéliome.

Voie et mode d'administration

Prémédication :

Corticothérapie, administrée la veille, le jour et le lendemain de l'administration d'Alimta (4 mg équivalent de dexaméthasone 2 fois/jour)

Supplémentation en acide folique et en vitamine B12 indispensable:

- Acide folique : débutée 1 semaine avant la première dose et poursuivie pendant toute la durée du traitement et pendant 3 semaines après la dernière dose d'Alimta.
- Vitamine B12 : 1 ampoule de 1000µg 1 semaine avant la première dose d'Alimta puis tous les trois cycles en même temps que

l'Alimta (en IM). Peut être prise exceptionnellement oralement si anticoagulant

Mises en garde - effets indésirables

- Toxicité hématologique très fréquente sur les 3 lignées
- Autres toxicités : rash cutané, diarrhée, stomatite, anorexie, asthénie...
- Peu alopéciant.

Interactions

- Précautions avec AINS (contre-indiqué les 2 jours avant et jusqu'à 5 jours après la prise d'Alimta)
- Les doses préventives faibles d'aspirine données en pathologie cardiovasculaire sont acceptées.
- Précautions avec les anticoagulants
- Association avec la radiothérapie