

Laboratoires

Wyeth Pharmaceuticals France
Tel pharmacovigilance : 01 41 02 79 64

Description médicament

Thérapie ciblée d'action intra-cellulaire -
inhibiteur de mTOR
Effet sur la croissance cellulaire et l'angiogénèse

Conditions de prescription et de délivrance

Prescription et usage hospitalier

Métabolisme

Elimination du temsirolimus et de ses
métabolites dans les selles principalement. Pas
de notion des adaptations posologiques chez
l'insuffisant hépatique.

Alertes

- Contre indications : Grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués
et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute
la durée du traitement

Indications

Cancer du rein avancé

Voie et mode d'administration

Prémédication par antihistaminique
systématique.
Pas d'adaptation à la fonction rénale.
Perfusion intraveineuse

Mises en garde - effets indésirables

Fréquents :

- réactions d'hypersensibilité,
- hyperglycémie/intolérance au glucose,
- infections,
- hyperlipidémie,
- insuffisance rénale, hypokaliémie
- altération de la cicatrisation, mucite
- anémie, thrombopénie
- rash,
- anorexie,
- oedèmes (notamment facial).

Rares pneumopathies interstitielles, saignements
intracérébraux, perforation de l'intestin.

Interactions

Avec les inhibiteurs du CYP3A4 (antiprotéases,
antifongiques, macrolides, inhibiteurs sélectifs de
la recapture de la sérotonine), augmentation des
concentrations de sirolimus, métabolite actif du
temsirolimus.