

Laboratoires

Pharmion

Tél pharmacovigilance : 01 53 42 43 00

Description médicament

Action immunomodulatrice et antiangiogénique

Conditions de prescription et de délivrance

Prescription et délivrance hospitalière

Métabolisme

Elimination urinaire

Demi vie : 8 à 9 h.

Alertes

- Contre indications : Grossesse, allaitement
- Précautions avec les vaccins vivants atténués et vaccin contre la fièvre jaune.
- Possible hypersensibilité au produit.
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement y compris contraception masculine
- Tératogène +++
- Pas de don de sperme

Indications

- Myélome
- Myélodysplasie, splénomégalie myéloïde
- Myélofibrose

Voie et mode d'administration

Ne pas croquer ni ouvrir les gélules

Prise unique possible le soir avant le coucher

Si oublié :

Datant de moins de 12h : prendre la dose oubliée

Datant de plus de 12 h : attendre la prise suivante

Mises en garde - effets indésirables

- Troubles du transit, dose dépendants
- Leuconeutropénie
- Aphtes
- Sécheresse cutanée
- Vertiges, sédation
- Neuropathie des membres inférieurs
- Phlébites, embolies pulmonaires
- Intolérance au lactose

Interactions

- Phénytoïne contre-indiquée
- Précautions avec les anticoagulants