

### Laboratoires

GSK

Tél pharmacovigilance : 01 39 17 80 16

### Description du médicament

Chimiothérapie : action sur l'ADN

### Conditions de prescription et de délivrance

Prescription, délivrance et usage hospitalier (possibilité de rétrocession)

### Métabolisme

- Elimination rénale majoritaire.
- Demi-vie de 3 H.

### Alertes

- Contre indications : Grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement

### Indications

- Cancer de l'ovaire, du poumon à petites cellules, du col de l'utérus

### Voie et mode d'administration

Perfusion intraveineuse de 5 j cycle toutes les 3 semaines.

Existe en gélules de 0,25 et 1 mg ;

Schéma de 2,3 mg/m<sup>2</sup> pendant 5 j toutes les 3 S.

### Mises en garde - effets indésirables

Fréquents :

#### - Toxicité hématologique

- Toxicité digestive
- Mucite, anorexie
- Alopécie, asthénie
- Fièvre, céphalées

Rares :

- Réactions d'hypersensibilité : rash cutané prurit

### Interactions

- Phénytoïne contre-indiquée
- Précautions avec les anticoagulants