

### Laboratoires

Pierre Fabre (per os)  
Tel pharmacovigilance : 01 49 10 96 18  
Génériques (en IV)

### Description médicament

Chimiothérapie. Action sur la mitose.

### Conditions de prescription et de délivrance

Voie veineuse : Prescription, délivrance et usage hospitalier (possibilité de rétrocession)

Voie orale : prescription hospitalière, disponible en ville.

A conserver au réfrigérateur

### Métabolisme

- Métabolisme hépatique, excrétion biliaire prédominante.
- Demi-vie 40 heures.

### Alertes

- Contre indications : Grossesse, allaitement
- Précaution avec les vaccins vivants atténués et le vaccin contre la fièvre jaune
- Possible hypersensibilité au produit
- Contraception indispensable pendant toute la durée du traitement

### Indications

- Cancer du poumon, du sein.
- Cancer de l'ovaire, de la prostate, et lymphomes dans certaines situations.

### Voie et mode d'administration

Voie veineuse en monothérapie ou association

Voie orale : prendre les capsules à la fin du repas sans les sucer, ni les mâcher.

### Mises en garde - effets indésirables

#### Fréquents :

- Toxicité surtout hématologique
- Sur les 3 lignées
- Neurotoxicité modérée : abolition des ROT, paresthésies rares.
- Parésie intestinale avec constipation, voire iléus paralytique.
- Nausées et vomissements
- Alopécie modérée.

#### Plus rares :

- Episode de dyspnée aigue, voire bronchospasme.

### Interactions

- Phénytoïne, Fosphénytoïne, Itraconazole déconseillés.
- Ciclosporine, Tacrolimus, Mitomycine C à prendre en compte
- Précautions avec les anticoagulants